

Экзаменационные проекты по квантовой теории поля

Осенний семестр

Д. В. Наумов

<https://neutrinohit.github.io/ru/qft-exams.html>

Экзамен по курсу «Квантовая теория поля для экспериментаторов» проходит в виде мини-проектов. Каждый студент получает собственную задачу и примерно неделю на подготовку. Каждый проект — небольшая научная работа: теория, расчёт, моделирование и сравнение с экспериментом.

Цели

- Применение полученных знаний для решения реальных научных задач.
- Освоение научных инструментов: $\text{\LaTeX}$, git, python.
- Развитие навыков совместной работы над проектами.
- Критическое мышление и креативность: проекты побуждают находить нестандартные решения и аргументировать их.

Структура отчёта

1. Введение: мотивация, краткий обзор литературы, постановка задачи.
2. Теоретическая часть: выводы, расчёты, формулы.
3. Практическая часть: моделирование, анализ данных, расчёты.
4. Обсуждение: графики, таблицы, интерпретация результатов.
5. Выводы: основные результаты, предложения по продолжению работы.
6. Список литературы: все использованные источники.

Технические аспекты

- Оформление проекта в $\text{\LaTeX}$; можно использовать онлайн-сервис overleaf.com.
- Фейнмановские диаграммы — пакет `tikz-feynman`.
- Графики — библиотека `matplotlib`.

Содержание

Квантование и нормальные моды	4
1 Гармонический квантовый осциллятор	4
Связанные состояния и спектры	6
2 Атом водорода	6

3	$\pi^+ \pi^-$ -атом	7
4	Резонансы и квазисвязанные состояния	8
	Релятивистская квантовая механика	9
5	Парадокс Клейна	9
6	Уравнение Дирака в 1+1 измерениях	11
7	Релятивистский тремор и давление	12
8	γ матрицы Дирака	13
	Спин и измерение	14
9	Эксперимент Штерна-Герлаха	14
10	Квантовый ластик и отложенный выбор	15
	Симметрии и теорема Нётер	17
11	Симметрии уравнения Дирака	17
12	Симметрии σ -модели	18
13	Спектральный поток и киральная аномалия в 1+1	19
	Вакуумные эффекты и границы	20
14	Эффект Казимира	20
15	Динамический эффект Казимира	21
	Функции Грина и волновые задачи	22
16	Дифракция на отверстиях	22
	Причинность и дисперсия	23
17	Тахион	23
	Геометрические эффекты	24

18 Фаза Берри	24
Калибровочные поля и квантование движения	27
19 Уровни Ландау: от нерелятивистских частиц к графену	27
20 Эффект Ааронова–Бома и калибровочная инвариантность	30

1. Гармонический квантовый осциллятор

Цель: Изучить спектр энергий и динамику одномерной цепочки квантовых гармонических осцилляторов, включая анализ симметрий и визуализацию эволюции системы.

1. **Гамильтониан системы:** Рассмотрите одномерную цепочку из N идентичных атомов с расстоянием между соседними атомами a . Гамильтониан системы:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\hat{P}_i^2}{2m} + \frac{k}{2} \sum_{i=1}^N (\hat{X}_{i+1} - \hat{X}_i)^2,$$

где:

- m — масса атома,
- $k = m\omega^2$ — жёсткость связи между соседними атомами,
- $\hat{P}_i$ и $\hat{X}_i$ — операторы импульса и координаты (отклонения от положения равновесия) i -го атома.

Объясните, почему взаимодействие учитывается только между соседними атомами.

2. **Переход к операторам нормальных мод:** Определите операторы нормальных мод:

$$\begin{aligned}\hat{Q}_k &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N e^{ikan} \hat{X}_n, \\ \hat{P}_k &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N e^{-ikan} \hat{P}_n,\end{aligned}$$

где $k = \frac{2\pi\ell}{Na}$, $\ell = 0, 1, \dots, N-1$.

- (a) Вычислите коммутаторы $[\hat{Q}_k, \hat{P}_{k'}]$, $[\hat{Q}_k, \hat{Q}_{k'}]$, и $[\hat{P}_k, \hat{P}_{k'}]$.
 - (b) Запишите гамильтониан $\hat{H}$ через $\hat{Q}_k$ и $\hat{P}_k$.
3. **Циклические граничные условия:** Предположите, что цепочка удовлетворяет циклическим граничным условиям:

$$\hat{X}_{N+1} = \hat{X}_1.$$

- (a) Найдите собственные частоты ω_k системы, где k — волновой вектор.
 - (b) Покажите, что система эквивалентна набору независимых гармонических осцилляторов, каждый из которых соответствует своей моде k .
4. **Динамика атомов:**

- (a) Вычислите волновую функцию $\psi(t)$ системы.
- (b) Постройте анимацию среднего смещения атомов $\langle X_n \rangle(t)$ при различных начальных условиях:
 - Один атом смещён: $X_i(0) \neq 0$, остальные $X_n(0) = 0$.
 - Два атома смещены: $X_i(0) \neq 0$, $X_k(0) \neq 0$, остальные $X_n(0) = 0$.

5. **Симметрии и сохраняющиеся заряды:**

- (a) Найдите все симметрии задачи (например, трансляционная симметрия, инвариантность относительно сдвигов времени).

- (b) Используя теорему Нётер, вычислите сохраняющиеся заряды, связанные с каждой симметрией.
- (c) Объясните физический смысл этих зарядов (например, энергия, импульс, фазовая корреляция мод).

2. Атом водорода

1. Вычислите волновые функции атома водорода для $n = 1$, $j = 1/2$. Нарисуйте их. Сравните с решением уравнения Шрёдингера при $n = 1$.
2. Вычислите и нарисуйте спектр излучения атома водорода в теории Дирака.
3. Энергия уровней атома водорода в гравитационном поле звезды изменяется. Для фотонов, испускаемых атомами, это приводит к гравитационному красному смещению:

$$z = \frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{GM}{Rc^2},$$

где G — гравитационная постоянная, M и R — масса и радиус звезды, соответственно. Вычислите $\Delta\nu/\nu$ для разных типов звёзд. Какие из них позволяют наблюдать *гравитационное* красное смещение? Сравните с экспериментом.

3. $\pi^+\pi^-$ -атом

Цель: Исследовать свойства $\pi^+\pi^-$ -атома с учётом кулоновского и сильного взаимодействий. Рассчитать энергию связи, поправку за счёт сильного взаимодействия и сравнить с экспериментальными данными.

1. **Кулоновская энергия связи:** Вычислите основное значение энергии $1s$ -состояния с учётом только электромагнитного взаимодействия. Оцените величину боровского радиуса.
2. **Поправка от сильного взаимодействия:** Рассчитайте поправку ΔE к энергии связи $1s$ -состояния по формуле:

$$\Delta E = \frac{\int_0^\infty |R_{1s}|^2 V_{\text{strong}}(r) r^2 dr}{\int_0^\infty |R_{1s}|^2 r^2 dr},$$

используя три различных потенциала для сильного взаимодействия:

- (а) *Контактный потенциал (дельта-функция):*

$$V_{\text{strong}}(r) = -\frac{4\pi a_0}{\mu} \delta^3(r),$$

где $\mu = m_\pi$, $a_0 \approx 0.22 m_\pi^{-1} \approx 0.31 \text{ fm}$ — длина рассеяния $\pi\pi$ в состоянии с изоспином $I = 0$.

- (b) *Потенциал конечного радиуса (ступенька):*

$$V_{\text{strong}}(r) = \begin{cases} -V_0, & r \leq R_{\text{strong}}, \\ 0, & r > R_{\text{strong}}, \end{cases}$$

где $V_0 \sim 100 \text{ MeV}$, $R_{\text{strong}} \sim 1 \text{ fm}$.

- (с) *Юкавский потенциал:*

$$V_{\text{strong}}(r) = -g^2 \frac{e^{-\mu_s r}}{r},$$

где g^2 — константа сильного взаимодействия, $\mu_s \sim 1 \text{ fm}^{-1}$.

3. Сравните полученные значения ΔE с экспериментальными данными.
4. Постройте графики зависимости ΔE от параметров a_0 , V_0 , g^2 для трёх предложенных моделей потенциала в сравнении с экспериментом.
5. Проанализируйте вклад сильного взаимодействия в общую энергию связи.

4. Резонансы и квазисвязанные состояния

Цель: Исследовать квазисвязанные состояния и резонансы в квантовой механике, связь ширины резонанса с временем жизни и интерпретацию резонансов как полюсов S -матрицы в комплексной плоскости энергии.

1. Рассмотрите одномерный потенциал:

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$$

2. Найдите коэффициенты отражения и прохождения $R(E)$, $T(E)$.
3. Покажите наличие резонансных максимумов $T(E) \approx 1$ при $E > 0$.
4. Продолжите энергию в комплексную плоскость $E \rightarrow E - i\Gamma/2$ и найдите условия полюсов S -матрицы.
5. Свяжите ширину резонанса Γ с временем жизни состояния

$$\tau \sim \frac{1}{\Gamma}.$$

6. Численно постройте:

- $T(E)$,
- траектории полюсов при изменении V_0 и a .

7. Обсудите, почему резонансы естественнее интерпретировать в языке рассеяния, а не «связанных состояний».

5. Парадокс Клейна

Цель: Исследовать рассеяние релятивистского фермиона на потенциальной ступеньке в рамках уравнения Дирака, понять происхождение так называемого парадокса Клейна и показать, что он исчезает при корректной интерпретации плотности тока и спектра состояний.

Рассматривается одномерная задача рассеяния фермиона массой m на потенциальной ступеньке

$$V(x) = V_0 \theta(x),$$

в рамках одночастичного уравнения Дирака, без вторичного квантования.

1. Уравнение Дирака в 1+1 измерениях

Рассмотрите стационарное уравнение Дирака

$$[-i\gamma^0\gamma^1\partial_x + \gamma^0 m + V(x)]\psi(x) = E\psi(x).$$

- (a) Выберите явное представление γ -матриц в 1+1 измерениях.
- (b) Запишите уравнение в матричном виде и найдите плоские волновые решения в областях $x < 0$ и $x > 0$.

2. Спектр и волновые векторы

Для областей:

$$\text{I: } x < 0, \quad V = 0, \quad \text{II: } x > 0, \quad V = V_0,$$

найдите соответствующие волновые векторы k_1, k_2 .

- (a) Покажите, что при

$$E < V_0 - m$$

волновой вектор k_2 остаётся вещественным.

- (b) Объясните, почему этот режим отсутствует в нерелятивистской теории.

3. Граничные условия

Запишите полное решение в виде:

$$\psi_I = \psi_{\text{in}} + R\psi_{\text{ref}}, \quad \psi_{II} = T\psi_{\text{tr}},$$

и наложите условия непрерывности волновой функции при $x = 0$.

- (a) Найдите коэффициенты отражения R и прохождения T .
- (b) Проверьте, что $R + T \neq 1$ при наивном определении вероятности.

4. Плотность тока

Определите плотность тока Дирака

$$j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \quad j^x = \psi^\dagger\alpha\psi.$$

- (a) Вычислите ток для падающей, отражённой и прошедшей волн.
- (b) Покажите, что закон сохранения тока

$$j_{\text{in}} = j_{\text{ref}} + j_{\text{tr}}$$

выполняется *строго*.

- (с) Объясните, почему при этом возможно $|R| > 1$.

5. Групповая скорость и интерпретация

- (а) Вычислите групповую скорость

$$v_g = \frac{dE}{dk}$$

в области II.

- (b) Покажите, что знак групповой скорости и знак тока совпадают.
(с) Объясните, почему решение в области $x > 0$ соответствует состояниям с отрицательной энергией относительно локального вакуума.

6. Физическая интерпретация

- (а) Объясните исчезновение парадокса при интерпретации решений как состояний античастиц.
(b) Обсудите, почему язык частиц и античастиц возникает уже на уровне одночастичного уравнения Дирака.
(с) Сравните с нерелятивистским случаем (уравнение Шрёдингера).

7. Численный анализ

С использованием python:

- (а) Постройте зависимости $R(E)$ и $T(E)$ для различных значений V_0 .
(b) Отметьте область $E < V_0 - m$.
(с) Постройте токи j_{in} , j_{ref} , j_{tr} и проверьте их баланс.

8. Обсуждение

- (а) Где именно возникает «парадокс» при неправильной интерпретации?
(b) Почему парадокс Клейна не является нарушением причинности?
(с) Какие элементы этого анализа требуют вторичного квантования, а какие — нет?

9. Литература

- B. R. Holstein, *Klein's paradox*, Am. J. Phys. **66**, 507 (1998).
- P. A. M. Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics*.
- W. Greiner, *Relativistic Quantum Mechanics*.

6. Уравнение Дирака в 1+1 измерениях

Рассмотрите уравнение Дирака в одном пространственном и одном временном измерениях.

1. Найдите явный вид γ^μ матриц, удовлетворяющих соотношению

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu}.$$

2. Найдите γ^5 .
3. Предполагая массу фермиона равной нулю, покажите, что получаются два независимых уравнения движения для частиц, движущихся влево и вправо.
4. Покажите, что сохраняются токи:

$$\partial_\mu \left(\bar{\psi} \gamma^\mu \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \psi \right) = 0, \quad \partial_\mu \left(\bar{\psi} \gamma^\mu \left(\frac{1 + \gamma^5}{2} \right) \psi \right) = 0.$$

5. Включите электрическое поле A^1 , постоянное в пространстве и медленно меняющееся со временем. Найдите гамильтониан и его собственные значения, считая, что ось x имеет конечную длину L и накладывая периодические граничные условия. Нарисуйте спектр энергий для левых и правых фермионов.
6. Что произойдет со спектром энергии, если медленно изменить A^1 на

$$\Delta A^1 = \frac{2\pi}{eL}?$$

7. Релятивистский тремор и давление

1. Пусть при $t = 0$ состояние свободного электрона задаётся функцией

$$\psi(0, \mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi d^2)^{3/4}} e^{-\frac{\mathbf{x}^2}{4d^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Найдите $\psi(t, \mathbf{x})$ при $t > 0$.

2. Получите аналитическое выражение для среднего тока в виде интеграла по 3-импульсу:

$$\mathbf{J} = \int d^3x \psi^\dagger(x) \boldsymbol{\alpha} \psi(x)$$

3. Вычислите этот интеграл и создайте анимацию для $\mathbf{J}(t)$.
4. Вечен ли тремор тока?
5. Вычислите давление P поля и создайте анимацию для $P(t)$.
6. Объясните полученные результаты.

8. γ матрицы Дирака

1. Покажите, что коммутатор $[\sigma_{\mu\nu}, \sigma_{\alpha\beta}]$ может быть записан через матрицы $\sigma_{\mu\nu}$. Найдите коэффициенты этого разложения.

2. Вычислите след

$$\text{Tr} (\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma_\rho \gamma_\sigma \gamma_\alpha \gamma_\beta \gamma_5) .$$

3. Вычислите:

$$\sigma_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu}, \quad \sigma_{\mu\nu} \gamma^5 \sigma^{\mu\nu}, \quad \sigma_{\mu\nu} \gamma^\alpha \sigma^{\mu\nu} .$$

9. Эксперимент Штерна-Герлаха

Цель: Исследовать траектории спин-1/2 частицы в неоднородном магнитном поле $\mathbf{B} = \nabla\Phi(x, y, z)$, используя уравнение Паули:

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left(\frac{(\hat{\mathbf{P}} - q\mathbf{A})^2}{2m} - \frac{q}{2m} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \right) \psi, \quad (2)$$

и теорему Эренфеста, и проанализировать влияние начального спина, неоднородности магнитного поля и начальных параметров частицы на её движение.

1. **Уравнения движения:** Используйте теорему Эренфеста для вычисления средних значений координат и импульса:

$$\frac{d\langle \mathbf{r} \rangle}{dt} = \frac{\langle \mathbf{p} \rangle}{m}, \quad \frac{d\langle \mathbf{p} \rangle}{dt} = \langle \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}) \rangle,$$

где $\boldsymbol{\mu} = \frac{q}{2m} \boldsymbol{\sigma}$ — магнитный момент частицы (силой Лоренца здесь пренебрегаем).

2. **Начальные условия:**

- (a) Начальные координаты: $\langle \mathbf{r}(0) \rangle = (0, 0, 0)$.
- (b) Начальный импульс: $\langle \mathbf{p}(0) \rangle = (p, 0, 0)$.
- (c) Начальный спин: вдоль $+z$ -оси ($\sigma_z = +1$) или $-z$ -оси ($\sigma_z = -1$).

3. **Магнитное поле:** Рассмотрите неоднородное магнитное поле, заданное, например, через скалярный потенциал $\Phi(x, y, z)$:

$$\mathbf{B} = \nabla\Phi(x, y, z), \quad \Phi(x, y, z) = B_0 z + \frac{B_1}{2}(x^2 - y^2).$$

Это поле приближённо моделирует реальную установку для эксперимента Штерна-Герлаха.

4. **Траектории:** Численно решите уравнения движения для средних координат $\langle x(t) \rangle$, $\langle y(t) \rangle$, $\langle z(t) \rangle$. Постройте траектории для частиц со спинами вдоль $+z$ и $-z$.

5. **Графики:**

- (a) Траектории $\langle x(t) \rangle$ и $\langle z(t) \rangle$ для разных значений начального импульса p , интенсивности поля B_0 и градиента B_1 .
- (b) Сравнение отклонений для частиц с разными начальными спинами ($+z$ и $-z$).

6. **Анализ:** Объясните, как неоднородность поля (B_1) и параметры частицы (p , m , начальный спин) влияют на траектории. Укажите, почему сила Лоренца в этом эксперименте не влияет на разделение траекторий.

10. Квантовый ластик и отложенный выбор

Цель проекта: Математически разобрать и численно смоделировать один из самых контринтуитивных экспериментов квантовой механики. Показать, как информация о пути частицы (which-path information) разрушает интерференцию и как корреляция событий позволяет «восстановить» её, не нарушая при этом принцип причинности.

В основе проекта лежит модифицированный двухщелевой эксперимент, где координата частицы на экране x запутывается с её внутренней степенью свободы (например, спином).

1. Теоретическая часть: запутанность и фаза

Пусть состояния частицы, прошедшей через щели A и B , описываются функциями $\psi_A(x)$ и $\psi_B(x)$. Состояние системы перед экраном имеет вид:

$$|\Psi(x)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_A(x)|\uparrow\rangle + \psi_B(x)|\downarrow\rangle).$$

1. **Уничтожение интерференции** Вычислите плотность вероятности обнаружения частицы на экране:

$$P(x) = \langle\Psi(x)|\Psi(x)\rangle.$$

Покажите, что из-за ортогональности спиновых состояний ($\langle\uparrow|\downarrow\rangle = 0$) интерференционный член исчезает. Объясните физический смысл: почему информация, которая *в принципе* может быть извлечена из спина, убивает волновую картину.

2. **Смена базиса (квантовый ластик)** Предположим, мы измеряем спин в диагональном базисе:

$$|+\rangle = \frac{|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Перепишите состояние $|\Psi(x)\rangle$ в этом базисе и найдите совместные плотности вероятности $P(x, \pm) = |\langle\pm|\Psi(x)\rangle|^2$ для подвыборок частиц.

3. **Восстановление картины** Покажите, что в распределениях $P(x, +)$ и $P(x, -)$ интерференционные члены присутствуют, но сдвинуты по фазе на π . Докажите, что:

$$P(x, +) + P(x, -) = P(x).$$

2. Практическая часть: моделирование методом Монте-Карло

Для экспериментатора важно понимать, как «магия» превращается в статистику.

1. **Генерация данных** Используя python, сгенерируйте массив из 10^5 событий. Для каждого события:

- (a) Разыграйте координату x согласно распределению $P(x)$.
- (b) Для каждого x разыграйте результат измерения спина (+ или -) с вероятностями $P(x, +)/P(x)$ и $P(x, -)/P(x)$.

2. **Сортировка событий** Постройте общую гистограмму всех x . Затем, используя результаты измерения спина, постройте две отдельные гистограммы для «плюс-событий» и «минус-событий». Прдемонстрируйте, как из бессистемного распределения возникают две интерференционные картины.

3. Обсуждение: причинность и «стирание прошлого»

1. **Парадокс отложенного выбора** Представьте, что спин измеряется *после* того, как частица попала на экран. Объясните, почему это не является сигналом из будущего в прошлое.
2. **Теорема о запрете сверхсветовой связи** Обсудите, может ли наблюдатель у экрана мгновенно узнать, какой базис для измерения спина выбрал его коллега в другом конце лаборатории.
3. **Интерпретация** Почему фраза «мы стёрли информацию о пути, и частица передумала» является методологически вредной для физика-исследователя?

4. Что сдать

1. Аналитический расчёт плотностей $P(x, \pm)$.
2. Скрипт на python с графиками: общее распределение (без интерференции) и две коррелированные гистограммы (с интерференцией).
3. Краткое эссе (0.5 страницы) с разрешением парадокса причинности.

Литература

- Y.-H. Kim, R. Yu, S.P. Kulik, Y. Shih, *A Delayed Choice Quantum Eraser*, Phys. Rev. Lett. **84**, 1 (2000).
- Р. Фейнман, *Фейнмановские лекции по физике*, Том 3 (Квантовая механика).

11. Симметрии уравнения Дирака

1. Используя теорему Нётер, получите сохраняющийся ток для

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\hat{\partial}\psi - m\bar{\psi}\psi$$

при глобальных калибровочных преобразованиях

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi, \quad \bar{\psi} \rightarrow e^{-i\alpha}\bar{\psi}.$$

2. Используя теорему Нётер, получите сохраняющийся ток для $\mathcal{L} = i\bar{\psi}\hat{\partial}\psi$ при киральном преобразовании

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha\gamma^5}\psi.$$

Получите закон преобразования поля $\bar{\psi}$.

3. Докажите, что действие для безмассового поля Дирака инвариантно при преобразованиях дилатации:

$$x \rightarrow x' = e^{-\rho}x, \quad \psi(x) \rightarrow \psi'(x') = e^{3\rho/2}\psi(x).$$

Найдите соответствующие нётеровский ток и заряд.

12. Симметрии σ -модели

Лагранжиан σ -модели:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} [(\partial_\mu \sigma)(\partial^\mu \sigma) + (\partial_\mu \boldsymbol{\pi}) \cdot (\partial^\mu \boldsymbol{\pi})] + i\bar{\Psi}\hat{\partial}\Psi + g\bar{\Psi}(\sigma + i\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\pi}\gamma_5)\Psi - \frac{m^2}{2}(\sigma^2 + \boldsymbol{\pi}^2) - \frac{\lambda}{4}(\sigma^2 + \boldsymbol{\pi}^2)^2,$$

где

- $\sigma(x)$ — скалярное поле,
- $\boldsymbol{\pi}(x)$ — трёхкомпонентное скалярное поле,
- $\Psi(x)$ — дублет фермионных полей,
- $\boldsymbol{\tau}$ — матрицы Паули.

Симметрия: Докажите, что лагранжиан $\mathcal{L}$ обладает следующей симметрией:

$$\sigma(x) \rightarrow \sigma(x),$$

$$\boldsymbol{\pi}(x) \rightarrow \boldsymbol{\pi}(x) - \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{\pi}(x),$$

$$\Psi(x) \rightarrow \Psi(x) + i\frac{\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\tau}}{2}\Psi(x),$$

где $\boldsymbol{\alpha}$ — 3-вектор бесконечно-малых параметров преобразования. Найдите соответствующий нётеровский ток.

13. Спектральный поток и киральная аномалия в 1+1

Цель: Понять происхождение киральной аномалии как геометрического эффекта, связанного со спектральным потоком уровней энергии.

1. Рассмотрите безмассовое уравнение Дирака в 1+1:

$$i\gamma^\mu(\partial_\mu + ieA_\mu)\psi = 0,$$

на кольце длины L .

2. Наложите периодические граничные условия и найдите спектр энергий $E_n(A_1)$.

3. Медленно изменяйте $A_1(t)$ от 0 до

$$\Delta A_1 = \frac{2\pi}{eL}.$$

4. Постройте эволюцию уровней энергии и покажите, что уровни пересекают ноль.
5. Покажите, что число правых и левых состояний меняется, несмотря на формальное сохранение кирального тока.
6. Обсудите, почему это невозможно объяснить без учёта вакуума, даже в одночастичной постановке.

14. Эффект Казимира

1. Рассмотрите эффект Казимира в 3D. Вычислите давление притяжения пластин, используя формулу Эйлера-Маклорена.
2. Объясните природу притяжения пластин. Можно ли извлекать энергию из вакуума этим способом?
3. Оцените величину давления. Сравните с гравитационным притяжением пластин в зависимости от расстояния между ними.
4. Сделайте обзор экспериментальных методов и результатов измерения эффекта Казимира.

15. Динамический эффект Казимира

Цель: Исследовать рождение реальных квантов из вакуума при нестационарных граничных условиях.

1. Рассмотрите одномерное скалярное поле $\phi(t, x)$ с граничным условием:

$$\phi(t, 0) = \phi(t, L(t)) = 0,$$

где

$$L(t) = L_0(1 + \epsilon \sin \omega t).$$

2. Найдите мгновенные моды поля и их частоты $\omega_n(t)$.

3. Покажите, что при резонансном условии

$$\omega \approx 2\omega_n$$

возникает экспоненциальный рост числа квантов.

4. Численно вычислите энергию излучения как функцию времени.
5. Обсудите физический смысл: откуда берётся энергия рождённых квантов (работа внешней силы,двигающей границу) и почему закон сохранения энергии выполняется.

16. Дифракция на отверстиях

1. Рассмотрите рассеяние скалярного поля $\phi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$, где $\mathbf{k} = (0, 0, k)$, в рамках уравнения Гельмгольца.
2. Найдите функцию Грина уравнения Гельмгольца.
3. Рассмотрите малое отверстие в непрозрачном экране в форме: а) квадрата, б) равностороннего треугольника.
4. Вычислите численно поле за экраном в дальней зоне.

17. Тахион

Тахион — это гипотетическая частица, движущаяся со скоростью, превышающей скорость света. Часто это интерпретируется как возможность передавать сверхсветовые сигналы. Исследуйте вопрос: так ли это?

1. Рассмотрите цепочку из маятников в однородном гравитационном поле, подвешенных к общему основанию и соединенных пружинками. Расстояние между маятниками равно a .
2. Покажите, что функция Лагранжа для этой системы имеет вид:

$$L = \sum_i \left(A \dot{\phi}_i^2 - B(\phi_i - \phi_{i-1})^2 - C(1 - \cos \phi_i) \right),$$

где ϕ_i — угол отклонения i -го маятника от положения равновесия. Определите A, B, C .

3. Сделайте переход к бесконечному числу маятников в пределе $a \rightarrow 0$. Покажите, что лагранжиан эквивалентен

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 - m^2 (1 - \cos \phi).$$

4. Получите уравнение движения поля ϕ :

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + m^2 \sin \phi = 0.$$

5. В случае малого отклонения от положения устойчивого равновесия $\phi = 0$ получается обычное уравнение Клейна-Фока-Гордона:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + m^2 \phi = 0.$$

6. В случае малого отклонения от положения неустойчивого равновесия $\phi = \pi$ получается уравнение Клейна-Фока-Гордона с отрицательным квадратом массы:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - m^2 \phi = 0.$$

Формально, плоская волна $\phi = e^{-i\omega t + ikx}$ даёт:

$$\omega^2 = k^2 - m^2, \quad \text{и групповая скорость} \quad v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{k}{\omega} > 1.$$

7. Покажите, что решение уравнения:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} - m^2 \right) \phi = \delta(t) \delta(x)$$

распространяется не быстрее света: запаздывающая функция Грина равна нулю вне светового конуса.

18. Фаза Берри

Краткая теоретическая справка: геометрическая фаза и калибровочная структура

Рассмотрим гамильтониан $H(\mathbf{R})$, зависящий от набора внешних параметров $\mathbf{R}$, и его собственные состояния

$$H(\mathbf{R}) |n(\mathbf{R})\rangle = E_n(\mathbf{R}) |n(\mathbf{R})\rangle,$$

предполагая, что уровень E_n невырожден.

Если параметры $\mathbf{R}(t)$ меняются медленно (адиабатически), то при начальном состоянии $|n(\mathbf{R}(0))\rangle$ решение уравнения Шрёдингера имеет вид

$$|\psi(t)\rangle = e^{i\alpha_n(t)} |n(\mathbf{R}(t))\rangle,$$

где фаза $\alpha_n(t)$ удовлетворяет

$$\dot{\alpha}_n(t) = -E_n(t) + i\langle n(\mathbf{R}(t)) | \dot{n}(\mathbf{R}(t)) \rangle.$$

Интегрируя по времени, получаем

$$\alpha_n(T) = - \int_0^T E_n(t) dt + \gamma_B,$$

где

$$\gamma_B = i \int_0^T \langle n(\mathbf{R}(t)) | \dot{n}(\mathbf{R}(t)) \rangle dt = i \oint_C \langle n | \nabla_{\mathbf{R}} n \rangle \cdot d\mathbf{R}.$$

Величина

$$\mathcal{A}(\mathbf{R}) = i\langle n(\mathbf{R}) | \nabla_{\mathbf{R}} n(\mathbf{R}) \rangle$$

называется *калибровочным потенциалом Берри*. При фазовом преобразовании собственных состояний

$$|n(\mathbf{R})\rangle \rightarrow e^{i\chi(\mathbf{R})} |n(\mathbf{R})\rangle$$

он трансформируется как

$$\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} - \nabla_{\mathbf{R}} \chi,$$

что полностью аналогично калибровочному потенциалу электродинамики.

Физически наблюдаемой величиной является не сам потенциал, а его кривизна

$$\mathcal{F} = \nabla_{\mathbf{R}} \times \mathcal{A},$$

которая инвариантна относительно калибровочных преобразований. Для замкнутого контура C фаза Берри выражается через поток этой кривизны:

$$\gamma_B = \int_S \mathcal{F} \cdot d\mathbf{S},$$

где S — поверхность, натянутая на контур C в пространстве параметров.

Таким образом, геометрическая фаза определяется исключительно геометрией пути в пространстве параметров и не зависит от скорости его прохождения.

Цель: Построить измеримый протокол для фазы Берри спина $\frac{1}{2}$ в медленно меняющемся магнитном поле, *показать, что геометрическая фаза является следствием калибровочной структуры пространства собственных состояний*, отделить её от динамической фазы и численно проверить условия адиабатичности.

1. Два пути в пространстве параметров: одинаковая динамика, разная геометрия

Рассмотрите магнитное поле фиксированного модуля B_0 с направлением

$$\mathbf{n}(t) = \frac{\mathbf{B}(t)}{B_0}, \quad |\mathbf{n}(t)| = 1,$$

и гамильтониан

$$H(t) = -\gamma B_0 \mathbf{n}(t) \cdot \mathbf{S}.$$

Постройте *две* циклические эволюции $\mathbf{n}_A(t)$ и $\mathbf{n}_B(t)$ на сфере направлений так, чтобы

- (a) телесные углы $\Omega_A \neq \Omega_B$ различались;
- (b) при этом динамическая фаза совпадала:

$$\int_0^T E_0(t) dt \text{ одинакова для путей } A \text{ и } B.$$

Замечание. Можно взять два конуса с разными θ и подобрать времена так, чтобы $\int_0^T |B(t)| dt$ совпало (или зафиксировать B_0 и одинаковое T).

2. Интерференционный протокол

Рассмотрите «рамзей-подобный» протокол для двухуровневой системы (спина):

- (a) подготовить суперпозицию двух собственных состояний $H(0)$;
- (b) в одной ветви (плече интерферометра) реализовать путь A , в другой — путь B ;
- (c) в конце сделать проекцию на исходный базис и измерить интерференционный сигнал.

Сформулируйте, как наблюдаемая фаза интерференции зависит от

$$\Delta\gamma = \gamma_B(A) - \gamma_B(B).$$

Поясните, почему *именно разность* геометрических фаз является физически наблюдаемой, а «абсолютная» фаза зависит от выбора калибровки собственных векторов.

3. Калибровочная структура: связь Берри и «магнитный монополю» в пространстве параметров

Определите калибровочный потенциал Берри для основного состояния:

$$\mathcal{A}(\mathbf{n}) = i\langle 0(\mathbf{n}) | \nabla_{\mathbf{n}} | 0(\mathbf{n}) \rangle.$$

- (a) Покажите, что при преобразовании фазового выбора $|0\rangle \rightarrow e^{i\chi(\mathbf{n})}|0\rangle$ потенциал меняется как $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} - \nabla_{\mathbf{n}}\chi$.
- (b) Вычислите кривизну (поле Берри)

$$\mathcal{F} = \nabla_{\mathbf{n}} \times \mathcal{A},$$

и интерпретируйте её как поле «монополя» в пространстве направлений $\mathbf{n}$.

- (c) Выберите две разные калибровки собственных состояний (например, сингулярные на северном и южном полушариях сферы направлений $\mathbf{n}$) и покажите, что:
 - i. потенциал Берри $\mathcal{A}$ зависит от выбора калибровки;
 - ii. кривизна $\mathcal{F}$ и фаза γ_B для замкнутого контура остаются неизменными.

4. Численная проверка: адиабатичность и ошибка переходов

Реализуйте численное решение уравнения Шрёдингера

$$i \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle$$

для путей A и B .

- (а) Постройте вероятность остаться в основном состоянии:

$$P_0(t) = |\langle 0(t) | \psi(t) \rangle|^2.$$

- (b) Введите безразмерный параметр адиабатичности

$$\epsilon(t) = \frac{|\langle 1(t) | \dot{H}(t) | 0(t) \rangle|}{(E_1(t) - E_0(t))^2},$$

и проверьте связь: чем меньше $\max_t \epsilon(t)$, тем ближе $P_0(T)$ к 1.

- (с) Для фиксированного пути (например, конуса) исследуйте зависимость ошибки

$$1 - P_0(T)$$

от периода T (логарифмический график).

5. Извлечение геометрической фазы из численного решения

Численно извлеките полную фазу перекрытия

$$\Phi_{\text{tot}} = \arg \langle \psi(0) | \psi(T) \rangle,$$

и отделите динамическую часть

$$\Phi_{\text{dyn}} = - \int_0^T \langle \psi(t) | H(t) | \psi(t) \rangle dt.$$

Определите численную оценку геометрической фазы как

$$\Phi_{\text{geom}} = \Phi_{\text{tot}} - \Phi_{\text{dyn}},$$

и сравните $\Phi_{\text{geom}}(A) - \Phi_{\text{geom}}(B)$ с предсказанием через телесные углы $\Omega_{A,B}$.

6. Наблюдаемость и робастность

- (а) Добавьте малый шум направления поля: $\mathbf{n}(t) \rightarrow \mathbf{n}(t) + \delta \mathbf{n}(t)$, с последующей нормировкой на единичную сферу. Проверьте, что результат зависит главным образом от геометрии контура (телесного угла), а не от деталей параметризации по времени.
- (b) Обсудите, в каком смысле геометрическая фаза «устойчива», и где эта устойчивость заканчивается (нарушение адиабатичности, пересечение вырождений).

7. Что сдать

- (а) Краткий теоретический вывод (1–2 страницы): интерференционный протокол, калибровка, $\Delta\gamma$ как наблюдаемая величина.
- (b) Численные графики: $P_0(t)$, $\epsilon(t)$, зависимость $1 - P_0(T)$, а также сравнение Φ_{geom} с геометрическим предсказанием.
- (с) Минимальный репозиторий git: код (python), короткий README, итоговый L^AT_EX-отчёт.

8. Литература

- M. V. Berry, *Quantal phase factors accompanying adiabatic changes*, Proc. R. Soc. A **392**, 45 (1984).

19. Уровни Ландау: от нерелятивистских частиц к графену

Цель проекта: Изучить квантование движения заряженной частицы в однородном магнитном поле. Показать, как магнитное поле приводит к дискретному спектру (уровням Ландау), как выбор калибровки влияет на вид волновых функций, и сравнить спектр для обычных электронов и безмассовых дираковских фермионов (эффективное описание графена).

Проект связывает стандартную квантовую механику, физику конденсированного состояния и релятивистские уравнения, лежащие в основе квантовой теории поля.

Рассматривается движение частицы в плоскости (x, y) в однородном магнитном поле $\mathbf{B} = B \hat{z}$.

1. Теоретическая часть: осцилляторная структура

В магнитном поле трансляционная инвариантность нарушается, и свободное движение частицы квантуется.

Для решения удобно использовать калибровку Ландау:

$$\mathbf{A} = (0, Bx, 0).$$

1. Гамильтониан и интегралы движения

Запишите гамильтониан заряженной частицы:

$$H = \frac{1}{2m} [p_x^2 + (p_y - qBx)^2].$$

- Покажите, что оператор p_y коммутирует с гамильтонианом.
- Используя подстановку $\psi(x, y) = e^{ik_y y} \phi(x)$, сведите задачу к одномерному гармоническому осциллятору.

2. Спектр уровней Ландау и вырождение

- Найдите энергетический спектр:

$$E_n = \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad \omega_c = \frac{|q|B}{m}.$$

- Определите положение центра осциллятора x_0 .
- Объясните физический смысл бесконечного вырождения уровней и его связь с трансляционной симметрией вдоль оси y .

3. Релятивистский случай: безмассовые фермионы Дирака (графен)

Рассмотрите уравнение Дирака для безмассовых частиц в магнитном поле, которое эффективно описывает электроны в графене:

$$H = v_F \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{p} - q\mathbf{A}).$$

- Покажите, что спектр уровней Ландау имеет вид

$$E_n = \pm v_F \sqrt{2|q|B\hbar n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- Объясните качественное отличие этого спектра от нерелятивистского случая.

2. Практическая часть: визуализация и плотность состояний

Цель — наглядно увидеть уровни Ландау и их физические последствия.

1. Волновые функции

Постройте плотность вероятности $|\psi(x, y)|^2$ для первых нескольких уровней Ландау.

- (a) Покажите, как положение максимума зависит от волнового вектора k_y .
- (b) Проиллюстрируйте локализацию состояний в магнитном поле.

2. Сравнение спектров

Постройте зависимости энергии $E_n(B)$ для:

- (a) нерелятивистского электрона;
- (b) безмассового фермиона Дирака (графен).

Подчеркните различие линейной и корневой зависимости от B .

3. Плотность состояний (DOS)

Смоделируйте плотность состояний, заменив δ -пики уровней Ландау узкими гауссианами (эффект уширения уровней).

- (a) Постройте DOS для разных значений B .
- (b) Покажите, как дискретная структура исчезает при $B \rightarrow 0$.

3. Обсуждение и связь с квантовой теорией поля

1. Квантовый эффект Холла

Объясните, как наличие щели между уровнями Ландау приводит к появлению плато холловской проводимости. Какую роль играет вырождение уровней?

2. Магнитная длина

Введите магнитную длину

$$\ell_B = \sqrt{\frac{\hbar}{|q|B}}.$$

Обсудите её физический смысл и роль как фундаментального масштаба в задачах со сильными магнитными полями (графен, нейтронные звёзды, КТП в сильных полях).

3. Нулевой уровень и топология

В случае графена существует уровень с энергией $E = 0$. Обсудите его связь с киральной симметрией, спектральной асимметрией и топологическими свойствами системы.

4. Что сдать

- 1. Вывод уровней Ландау для уравнения Шрёдингера и уравнения Дирака.
- 2. Графики волновых функций и спектров.
- 3. Численную модель плотности состояний.

Литература

- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, *Квантовая механика* (§112).
- A. H. Castro Neto et al., *The electronic properties of graphene*, Rev. Mod. Phys. **81**, 109 (2009).
- D. Tong, *Lectures on the Quantum Hall Effect*, arXiv:1606.06687.

20. Эффект Ааронова–Бома и калибровочная инвариантность

Цель проекта: Понять, почему в квантовой механике *калибровочный потенциал* A является физически значимой величиной, несмотря на то что классическая сила зависит только от магнитного поля B . Показать, что эффект Ааронова–Бома является *топологическим* и наблюдается как сдвиг интерференционной картины.

Рассматривается интерференция электронов в присутствии бесконечно длинного тонкого соленоида с магнитным потоком Φ , при этом

$$B = 0 \quad \text{в области движения электронов.}$$

1. Теоретическая часть: фаза и калибровочный потенциал

В классической электродинамике частица чувствует только локальное поле $B = \nabla \times A$. В квантовой механике фазовая структура волновой функции делает векторный потенциал A наблюдаемым.

1. Уравнение Шрёдингера с векторным потенциалом

Рассмотрите уравнение Шрёдингера для частицы заряда q :

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{2m} (-i\hbar \nabla - qA)^2 \psi.$$

Поясните, почему даже при $B = 0$ потенциал A может влиять на фазу волновой функции.

2. Фазовый множитель

Пусть $\psi_0(\mathbf{r}, t)$ — решение уравнения Шрёдингера при $A = 0$. Покажите, что при ненулевом A решение можно записать в виде

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \exp\left(\frac{iq}{\hbar} \int_C A \cdot d\mathbf{l}\right) \psi_0(\mathbf{r}, t),$$

где интеграл берётся вдоль траектории частицы.

3. Разность фаз в интерферометре

Рассмотрите двухщелевой эксперимент. Пусть электрон проходит по двум траекториям C_1 и C_2 , охватывающим соленоид.

Покажите, что разность фаз равна

$$\Delta\varphi = \frac{q}{\hbar} \oint A \cdot d\mathbf{l} = \frac{q\Phi}{\hbar}.$$

Объясните, почему результат зависит только от магнитного потока Φ , а не от формы траекторий.

2. Практическая часть: моделирование интерференции

Цель — численно показать, что изменение магнитного потока приводит к сдвигу интерференционных полос.

1. Интерференционная картина

Смоделируйте интенсивность на экране:

$$I(x) = I_0 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda L} x + \frac{q\Phi}{\hbar}\right) \right],$$

где d — расстояние между щелями, L — расстояние до экрана, λ — длина волны де Бройля электронов.

Постройте $I(x)$ для нескольких значений Φ .

Выведите эту формулу.

2. Анимация

Постройте анимацию, показывающую, как интерференционная картина смещается при изменении

$$\Phi \in [0, \Phi_0], \quad \Phi_0 = \frac{h}{q}.$$

3. Монте-Карло

Смоделируйте попадание отдельных электронов на экран:

- разыграйте координаты попаданий согласно распределению $I(x)$;
- постройте гистограммы для разных значений Φ ;
- покажите, как интерференционная картина возникает статистически.

3. Обсуждение и физический смысл

1. Калибровочная инвариантность

Объясните, почему фаза волновой функции зависит от выбора калибровки, но наблюдаемая разность фаз $\Delta\varphi$ — нет.

2. Топологический характер

Поясните, почему сдвиг картины периодичен по потоку с периодом Φ_0 (целое число квантов потока не наблюдаемо, важна лишь дробная часть Φ/Φ_0) и не чувствителен к локальным деформациям траекторий.

4. Что сдать

- Теоретический вывод.
- Анимацию интерференционной картины.
- Минимальный git-репозиторий с кодом (python) и отчётом.

Литература

- Y. Aharonov, D. Bohm, *Significance of electromagnetic potentials in the quantum theory*, Phys. Rev. **115**, 485 (1959).